


ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПРИСАСЫВАНИИ КЛЕЩА

В случае, если вас укусил клещ, главное – не паниковать!

Чтобы свести к минимуму вероятность поражения инфекциями, передающимися с укусом клеща, необходимо:

① Срочно извлечь клеща.

Если нет возможности обратиться за медицинской помощью, удалите клеща самостоятельно.



Ранку необходимо обработать дезинфицирующей жидкостью (70% спирт, 5% йод, одеколон).
Если при извлечении клеща оторвался или остался в ранке его хоботок, удалите его как обычную занозу стерильной иглой.

ПРИ УДАЛЕНИИ КЛЕЩА НЕЛЬЗЯ:



Касаться клеща незащищенными руками



Сдавливать клеща



Мазать масляными растворами, мазями, бензином, керосином и т.п.

② Обратиться в больницу для назначения лечения



ГБУЗ ТО "Областная инфекционная клиническая больница"
г. Тюмень, ул. Комсомольская, 54а

③ Рекомендуется сдать клеща на исследование для определения зараженности вирусными инфекциями.



ФБУН «Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии»
Роспотребнадзора



ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»



Помните! Клещевой энцефалит – это вирусное заболевание, которое поражает центральную нервную систему. Осложнения этой инфекции могут привести к параличу и даже к летальному исходу.

Прививка – лучшая защита от клещевого энцефалита!
Поставить ее можно в прививочных кабинетах поликлиник, медсанчастьей, здравпунктов после консультации врача.

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ НА
WWW.TAKZDOROVO-TO.RU





КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ



- острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы. При энцефалите поражается головной мозг, поэтому страдают нейроны (нервные клетки мозга). Люди, переболевшие энцефалитом, переживают последствия, схожие с последствиями инсульта, травм головы и других заболеваний головного мозга. Как правило, они связаны с нарушениями когнитивных и речевых функций.

ПРОФИЛАКТИКА


Вакцинация является наиболее эффективным методом защиты от заболевания.

К ней допускаются клинически здоровые люди (дети с 12 месяцев) после врачебного осмотра.

Брюки и длинные рукава одежды, высокая обувь и головной убор смогут защитить от укуса



Нанесение на одежду специального защитного средства



Проведение осмотра одежды каждые 1-2 часа на прогулке и по возвращении домой



Избегание контакта с высокой травой и кустарниками



Регулярный осмотр животных, гуляющих на улице

